

Impfkalender für Säuglinge und Kleinkinder

nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand Juli 2010



Impfung	Alter in Monaten				
	2	3	4	11 – 14	15 – 23 a)
Wundstarrkrampf (Tetanus) ¹	1.	2.	3.	4.	
Diphtherie ¹	1.	2.	3.	4.	
Keuchhusten (Pertussis) ¹	1.	2.	3.	4.	
Haemophilus influenzae Typ b ¹	1.	2. b)	3.	4.	
Kinderlähmung (Poliomyelitis) ¹	1.	2. b)	3.	4.	
Hepatitis B ¹	1.	2. b)	3.	4.	
Pneumokokken ²	1.	2.	3.	4.	
Meningokokken				1. ab 12 Monate	
Masern, Mumps, Röteln (MMR) ³				1.	2.
Windpocken (Varizellen) ³				1.	2.

a) Impfstatus überprüfen, gegebenenfalls vervollständigen

b) Bei monovalenter Anwendung beziehungsweise bei Kombinationsimpfstoffen ohne Pertussiskomponente kann diese Dosis entfallen.

¹ Mindestens 4 Wochen Abstand zwischen den Grundimmunisierungen; mindestens 6 Monate zwischen vorletzter und letzter Impfung der Grundimmunisierung

² Generelle Impfung für Säuglinge und Kleinkinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr mit einem Pneumokokken-Konjugatimpfstoff

³ Mindestabstand zwischen den Impfungen 4 bis 6 Wochen

Impfkalender für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand Juli 2010

Impfung	Alter in Jahren				
	5–6 a)	9–11 a)	12–17 a)	ab 18	≥ 60
Wundstarrkrampf (Tetanus) ¹	A	A		A ⁵	
Diphtherie ¹ b)	A	A		A ⁵	
Keuchhusten (Pertussis) ¹	A	A		A ⁶	
Kinderlähmung (Poliomyelitis) ¹		A			
Hepatitis B ¹		G			
Pneumokokken ²					S
Windpocken (Varizellen)		c)			
Grippe (Influenza) ³					S
Humane Papillomaviren (HPV) ⁴			SM		

Erläuterungen	
A	Auffrischimpfung: zu den Impfabständen bei Verwendung von Kombinationsimpfstoffen, die Td-Antigen beinhalten, siehe Anwendungshinweis in den Neuerungen der STIKO-Empfehlungen
G	Grundimmunisierung (ungeimpfte Jugendliche), Komplettierung bei unvollständigem Impfschutz
S	Standardimpfung = Regelimpfung
SM	Standardimpfung für Mädchen

a) Impfstatus überprüfen, gegebenenfalls vervollständigen

b) Alter von 5 beziehungsweise 6 Jahren: Auffrischung mit reduziertem Diphtherietoxoid-Gehalt (d)

c) Ungeimpfte 9-17-Jährige ohne Varizellen-Anamnese

¹ Mindestens 4 Wochen Abstand zwischen den Grundimmunisierungen; mindestens 6 Monate zwischen vorletzter und letzter Impfung der Grundimmunisierung

² Standardimpfung für Personen ≥ 60 Jahre mit Polysaccharid-Impfstoff; Wiederholungsimpfung im Abstand von 5 Jahren nur bei bestimmten Indikationen

³ Jährlich mit dem von der WHO empfohlenen aktuellen Impfstoff

⁴ Grundimmunisierung mit 3 Dosen für alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren

⁵ Jeweils 10 Jahre nach der letzten vorangegangenen Dosis

⁶ Alle Erwachsenen sollen die nächste fällige Td-Impfung **einmalig** als Tdap-Kombinationsimpfung (bei entsprechender Indikation als Tdap-IVP-Kombinationsimpfung) erhalten.