

21. Mai 2025

# Verordnung Aktuell

## Impfung gegen Meningokokken B

Der Bezug des Meningokokken-B-Impfstoffs erfolgt über Ihren **Sprechstundenbedarf<sup>1</sup> (Muster 16a bay)**.

Sollten Sie für die Meningokokken-B-Impfstoffe in Vorleistung gegangen sein und diese jetzt nicht mehr nach der bisherigen Empfehlung als Privatleistung verimpfen und abrechnen können, wenden Sie sich bitte an das Postfach [arzneimittelteam@kvb.de](mailto:arzneimittelteam@kvb.de).

In Deutschland stehen zwei Impfstoffe gegen Meningokokken B zur Verfügung.

- **Bexsero®** für Personen  $\geq 2$  Monate (Grundimmunisierung, Indikationsimpfung)
- **Trumenba®** für Personen  $\geq 10$  Jahre (Indikationsimpfung)



**Bitte achten Sie auf eine wirtschaftliche Verordnung.**

Gemäß der Schutzimpfungs-Richtlinie<sup>2</sup> gilt Folgendes.

### Grundimmunisierung

→ im Alter von 2, 4 sowie 12 Monaten

In den Hinweisen zur Umsetzung wird ergänzt, dass ein Anspruch auf Nachholimpfung **nur bis zum Alter von 4 Jahren** besteht (Bei Meningokokken B abweichend von § 11 Absatz 2 Nachholimpfung nur bis zum Alter von 4 Jahren).

Für alle anderen untersuchten Altersgruppen (5 bis 14 Jahre, 14 bis 19 Jahre und ab 20 Jahren) empfiehlt die STIKO keine allgemeine Meningokokken-B-Impfung. Insofern wird diese auch nicht in die SI-RL aufgenommen. Daneben sieht die SI-RL weiterhin die Grundimmunisierung gegen Meningokokken C im Alter von 12 Monaten vor.

<sup>1</sup> seit 08.05.2025; siehe Serviceschreiben vom 08.05.2025

<sup>2</sup> Schutzimpfungs-Richtlinie: [www.g-ba.de/richtlinien/60/](http://www.g-ba.de/richtlinien/60/)

### Indikationsimpfung

Indikationsimpfung für gesundheitlich gefährdete Personen mit angeborener oder erworbener Immundefizienz, insbesondere

- Komplement-/Properdindefizienz
- Therapie mit C5-Komplement-Inhibitoren (z. B. Eculizumab oder Ravulizumab)
- Hypogammaglobulinämie
- funktioneller oder anatomischer Asplenie

Impfung gegen die Serogruppen A, C, W, Y und/oder B, sofern die verfügbaren Impfstoffe für die Altersgruppe zugelassen sind<sup>3</sup>.

### Berufliche Indikation

- Gefährdetes Laborpersonal (bei Exposition gegenüber Neisseria meningitidis-haltigen Aerosolen)

In den Hinweisen zur Umsetzung wird ergänzt, dass die Impfung mit Meningokokken-ACWY-Konjugat-Impfstoff und einem Meningokokken-B-Impfstoff erfolgt.

Wir halten Sie up to date.

**Ihre KVB**



Weitere Infos rund um Verordnungen:

- [www.kvb.de/mitglieder/verordnungen](http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen)



KVB Servicecenter

**Kurze Frage – direkte Antwort**

**089 570 93-400 10**

Mo–Do 7:30–17:30 Uhr und Fr 7:30–16:00 Uhr

KVB Beratungszentrum

**Terminwunsch für ausführliche Beratung**

- [www.kvb.de/mitglieder/beratung](http://www.kvb.de/mitglieder/beratung)

Mo–Do 8:00–16:00 Uhr und Fr 8:00–13:00 Uhr

<sup>3</sup> Nähere Erläuterungen zur Anwendung: [www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2015/34\\_15.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](http://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2015/34_15.pdf?__blob=publicationFile&v=3) und [https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2015/37\\_15.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2015/37_15.pdf?__blob=publicationFile&v=3)