

12. November 2025

Verordnung Aktuell

Standardimpfungen

Vervollständigung möglich!¹

Unabhängig von den in der Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) genannten Altersgrenzen darf eine Standardimpfung bis zum vollendeten 18. Lebensjahr **nachgeholt** bzw. der Impfschutz **vervollständigt** werden (§ 11 Abs. 2 SI-RL²).

Ausnahmen

■ Haemophilus influenzae Typ b

- Grundimmunisierung im Alter von **2, 4** sowie **11 Monaten**; Frühgeborene erhalten zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von **3 Monaten**; insgesamt **4 Dosen**
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von 4 Jahren, d. h. bis einen Tag vor dem **5. Geburtstag** zulässig

Die Hib-Mono-Impfstoffe³ (Act-HIB®) sind in Deutschland außer Vertrieß.

Mehrfachimpfstoffe, die den Hib-Impfstoff enthalten, werden über den **Sprechstundenbedarf** (Muster 16a bay) bezogen. Um ggf. mit einem Mehrfachimpfstoff eine Vervollständigung der Impfung durchzuführen, achten Sie bitte auf die **Zulassung des Präparats**. Teilweise sind Mehrfachimpfstoffe nur für bestimmte Altersklassen, z. B. Säuglinge und Kleinkinder, zugelassen.

■ Meningokokken B

- Grundimmunisierung im Alter von **2, 4** sowie **12 Monaten**
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von 4 Jahren, d. h. bis einen Tag vor dem **5. Geburtstag** zulässig

¹ https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Impfkalender/Impfkalender_node.html

² <https://www.g-ba.de/richtlinien/60/>

³ Über internationale Apotheken ist der Impfstoff Act Hib oder Hiberix als Einzelimport (genehmigungspflichtig!) bestellbar.

■ Pneumokokken

- Grundimmunisierung reif geborener Säuglinge im Alter von 2, 4 sowie 11 Monaten. Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.
- Nur für Kinder bis zum vollendeten **2. Lebensjahr** abrechenbar (Bayerische Impfvereinbarung); wurde die Impfung erst im 2. Lebensjahr begonnen, sind nur 2 Impfstoffdosen im Mindestabstand von 8 Wochen erforderlich; die Vervollständigung des Impfschutzes durch die 2. Impfdosis kann noch bis zum **27. Lebensmonat erfolgen**.
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von 24 Monaten

■ Rotavirus

- Grundimmunisierung im Alter von **2 und 3 Monaten** (sowie ggf. 4 Monaten); erste Impfung möglichst frühzeitig – bereits ab dem Alter von **6 Wochen** möglich; je nach verwendetem Impfstoff **2 bzw. 3 Dosen** erforderlich; Mindestabstand zwischen Impfdosen sollte 4 Wochen betragen; Impfserie je nach Impfstoff möglichst bis zum Alter von **16 bzw. 20 bis 22 Wochen abgeschlossen**, spätestens bis zum Alter von **24 bzw. 32 Wochen**
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von **24 bzw. 32 Wochen** zulässig

■ Tetanus, Diphtherie und Polio

- Komplettierung der Impfung bei unvollständigem Impfstatus/-schutz auch noch im **Erwachsenenalter** möglich
- **Pertussis**: Einmalige Verabreichung für Erwachsene als Tdap-Impfung

Die Abrechnungsnummern finden Sie unter

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen

Wir halten Sie up to date.

Ihre KVB



Weitere Infos rund um Verordnungen:

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen



KVB Servicecenter

Kurze Frage - direkte Antwort

089 / 570 93-400 10

Mo-Do 7:30-17:30 Uhr und Fr 7:30-16:00 Uhr

KVB Beratungszentrum

Terminwunsch für ausführliche Beratung

→ www.kvb.de/mitglieder/beratung

Mo-Do 8:00-16:00 Uhr und Fr: 8:00-13:00 Uhr