

12. Dezember 2025

Verordnung Aktuell

Standardimpfungen

Vervollständigung möglich!¹

Unabhängig von den in der Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) genannten Altersgrenzen darf eine Standardimpfung bis zum vollendeten 18. Lebensjahr **nachgeholt** bzw. der Impfschutz **vervollständigt** werden (§ 11 Abs. 2 SI-RL²).

Ausnahmen

▀ **Haemophilus influenzae Typ b**

- Grundimmunisierung im Alter von **2, 4 sowie 11 Monaten**; Frühgeborene erhalten zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von **3 Monaten**; insgesamt **4 Dosen**
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von 4 Jahren, d. h. bis einen Tag vor dem **5. Geburtstag** zulässig

Die Hib-Mono-Impfstoffe³ (Act-HIB®) sind in Deutschland außer Vertrieb.

Mehrfachimpfstoffe, die den Hib-Impfstoff enthalten, werden über den **Sprechstundenbedarf** (Muster 16a bay) bezogen. Um ggf. mit einem Mehrfachimpfstoff eine Vervollständigung der Impfung durchzuführen, achten Sie bitte auf die **Zulassung des Präparats**. Teilweise sind Mehrfachimpfstoffe nur für bestimmte Altersklassen, z. B. Säuglinge und Kleinkinder, zugelassen.

▀ **Meningokokken B**

- Grundimmunisierung im Alter von **2, 4 sowie 12 Monaten**
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von 4 Jahren, d. h. bis einen Tag vor dem **5. Geburtstag** zulässig (Meningokokken-B-Impfung kann abgeschlossen werden, wenn sie **vor dem 5. Geburtstag begonnen** wurde und die vorgesehenen Impfabstände eingehalten werden)

¹ Robert-Koch-Institut: www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Impfkalender/impfkalender-node.html

² Schutzimpfungs-Richtlinie: www.g-ba.de/richtlinien/60/

³ Über internationale Apotheken ist der Impfstoff Act Hib oder Hiberix als Einzelimport (genehmigungspflichtig!) bestellbar.

■ Pneumokokken

- Grundimmunisierung reif geborener Säuglinge im Alter von **2, 4 sowie 11 Monaten**. Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.
- Nur für Kinder bis zum vollendeten **2. Lebensjahr** abrechenbar (Bayerische Impfvereinbarung); wurde die Impfung erst im 2. Lebensjahr begonnen, sind nur 2 Impfstoffdosen im Mindestabstand von 8 Wochen erforderlich; die Vervollständigung des Impfschutzes durch die 2. Impfdosis kann noch bis zum **27. Lebensmonat erfolgen**.
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von 24 Monaten

■ Rotavirus

- Grundimmunisierung im Alter von **2 und 3 Monaten** (sowie ggf. 4 Monaten); erste Impfung möglichst frühzeitig – bereits ab dem Alter von **6 Wochen** möglich; je nach verwendetem Impfstoff **2 bzw. 3 Dosen** erforderlich; Mindestabstand zwischen Impfdosen sollte 4 Wochen betragen; Impfserie je nach Impfstoff möglichst bis zum Alter von **16 bzw. 20 bis 22 Wochen abgeschlossen**, spätestens bis zum Alter von **24 bzw. 32 Wochen**
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von **24 bzw. 32 Wochen** zulässig

■ Tetanus, Diphtherie und Polio

- Komplettierung der Impfung bei unvollständigem Impfstatus/-schutz auch noch im **Erwachsenenalter** möglich
- **Pertussis:** Einmalige Verabreichung für Erwachsene als Tdap-Impfung

Die Abrechnungsnummern finden Sie unter

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen

Wir halten Sie up to date.

Ihre KVB



Weitere Infos rund um Verordnungen:
→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen



KVB Servicecenter
Kurze Frage - direkte Antwort
089 / 570 93-400 10
Mo–Do 7:30–17:30 Uhr und Fr 7:30–16:00 Uhr

KVB Beratungscenter
Terminwunsch für ausführliche Beratung
→ www.kvb.de/mitglieder/beratung
Mo–Do 8:00–16:00 Uhr und Fr: 8:00–13:00 Uhr