

2. April 2026

# Verordnung Aktuell

## Impfung gegen Pertussis (Keuchhusten)

Die Schutzimpfungs-Richtlinie<sup>1</sup> des Gemeinsamen Bundesausschusses fasst alle Empfehlungen für Alters- und Risikogruppen zusammen. Hier eine übersichtliche und praxisnahe Zusammenfassung.

Ein Pertussis-**Mono**-Impfstoff ist nicht verfügbar. Der Impfstoff wird als Komponente der **Mehrfachimpfstoffe** angeboten. Der Bezug erfolgt über Ihren **Sprechstundenbedarf**.

### Grundimmunisierung

Um Säuglinge frühzeitig und effektiv vor Pertussis zu schützen, erfolgt die Grundimmunisierung im Rahmen der 6-fach-Impfung (DTaP-IPV-Hib-HepB). Gemäß der Schutzimpfungs-Richtlinie gelten folgende Zeitpläne:

#### ■ Reifgeborene (2+1-Schema):

Standardmäßig sind **3 Dosen** vorgesehen:

- 1. Dosis mit 2 Monaten
- 2. Dosis mit 4 Monaten
- 3. Dosis mit 11 Monaten

#### ■ Frühgeborene (3+1-Schema):

Kinder, die vor der 37. SSW geboren werden, erhalten aufgrund der besonderen Vulnerabilität **4 Dosen**:

- 1. Dosis mit 2 Monaten
- 2. Dosis mit 3 Monaten
- 3. Dosis mit 4 Monaten
- 4. Dosis mit 11 Monaten

! **Mindestabstand von 6 Monaten** zwischen letzter und vorletzter Impfstoffdosis muss eingehalten werden.

<sup>1</sup> [www.g-ba.de/richtlinien/60/](http://www.g-ba.de/richtlinien/60/)

## Auffrischimpfung

Um den Impfschutz gegen Pertussis langfristig aufrechtzuerhalten, sieht die Schutzimpfungs-Richtlinie zwei zentrale Auffrischungen vor:

### 1. Vorschulalter (5 bis 6 Jahre)

- Empfehlung: 3-fach-Kombination (Diphtherie, Tetanus, Pertussis)
- Wirtschaftlichkeitshinweis: Die Verwendung eines 4-fach-Impfstoffs (inkl. Poliomyelitis) gilt in dieser Altersgruppe als unwirtschaftlich, da eine Polio-Impfung nicht empfohlen wird.

### 2. Jugendalter (9 bis 16 Jahre)

- Empfehlung: 4-fach-Kombination (Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis)

## Standardimpfung

Für den langfristigen Schutz gegen Pertussis sieht die Schutzimpfungs-Richtlinie für alle Erwachsenen eine **einmalige Impfung** vor.

### Umsetzung in der Praxis:

- **Kombinationsprinzip:** Erwachsene erhalten **einmalig** die nächste Impfung gegen Tetanus und Diphtherie als **Tdap-Kombinationsimpfung** (inklusive Pertussis-Komponente). (Kein Mono-Impfstoff verfügbar)
- **Wirtschaftlichkeitsgebot:** Der Einsatz eines **4-fach-Impfstoffs** (Tdap-IPV, zusätzlich gegen Poliomyelitis) ist nur dann zulässig und wirtschaftlich, wenn zum selben Zeitpunkt eine medizinische **Indikation für Polio<sup>2</sup>** besteht (z. B. fehlende Grundimmunisierung). Ohne spezifische Polio-Indikation ist der Tdap-Impfstoff zu bevorzugen, um dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 SGB V zu entsprechen.

## Indikationsimpfung

Zum Schutz von Neugeborenen und jungen Säuglingen sollen folgende Personengruppen geimpft werden:

### 1. Impfung in der Schwangerschaft

- **Indikation:** Jede Schwangere erhält in jeder Schwangerschaft eine Pertussis-Impfung. Dies gilt unabhängig davon, wann die letzte Impfung erfolgte.
- **Zeitpunkt:** idealerweise ab der **28. Schwangerschaftswoche** (Beginn des 3. Trimenons)
- **Frühgeburtsrisiko:** Besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburt, sollte die Impfung bereits im **2. Trimenon** durchgeführt werden.
- **Nachholen:** Wurde die Impfung in der Schwangerschaft versäumt, sollte die Mutter bevorzugt in den ersten Tagen nach der Geburt geimpft werden (sofern die letzte Impfung  $\geq$  10 Jahre zurückliegt).

---

<sup>2</sup> Eine routinemäßige Auffrischung gegen Poliomyelitis ab dem Alter von 18 Jahren wird nicht empfohlen.

## Indikationsimpfung

### 2. Schutz durch Kontaktpersonen (Kokon-Strategie)

- **Zielgruppe:** enge Haushaltskontakte (Eltern, Geschwister) sowie Betreuende (Großeltern, Babysitter, Tageseltern)
- **Bedingung:** Eine Impfung ist indiziert, wenn die letzte Dosis **10 Jahre oder länger** zurückliegt.
- **Timing:** Die Impfung sollte idealerweise spätestens **vier Wochen vor der Geburt** des Kindes abgeschlossen sein.

### Berufliche Indikation

Für Beschäftigte mit erhöhtem Expositionsrisiko oder Kontakt zu vulnerablen Gruppen ist der Pertussis-Schutz essenziell. Die Schutzimpfungs-Richtlinie regelt die Auffrischung wie folgt: Eine Auffrischung **alle 10 Jahre** ist indiziert für Personal in:

- **Medizinischen Einrichtungen:** unmittelbare Patientenversorgung in Arztpraxen, Krankenhäusern, der Schwangerenbetreuung und Geburtshilfe
- **Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 IfSG,** in denen **überwiegend minderjährige Personen betreut werden:** Personal in Kitas, Schulen oder Heimen

### Impfstoffwahl und Wirtschaftlichkeit

- **Kombinationsimpfstoff:** Da kein monovalenter Pertussis-Impfstoff verfügbar ist, erfolgt die Impfung als 3-fach-Kombination (Diphtherie-Tetanus-Pertussis / Tdap).
- **Polio-Komponente<sup>3</sup>:** Die Verwendung eines 4-fach-Impfstoffs (inkl. Poliomyelitis) ist im Rahmen der beruflichen Indikation für Erwachsene ab 18 Jahren unwirtschaftlich, da eine routinemäßige Polio-Auffrischung in diesem Alter nicht empfohlen wird.
- **Dosierung:** Es wird eine einzelne Dosis verabreicht.

---

<sup>3</sup> Ausnahmen Impfung gegen Poliomyelitis, Berufliche Indikation: Personal in Gemeinschaftsunterkünften für Einreisende aus Gebieten mit Infektionsrisiko, medizinisches Personal, das engen Kontakt zu Erkrankten haben kann, Laborpersonal mit Expositionsrisiko

## Abrechnung

Impfungen	Abrechnungsnummer		
	Erste Dosis eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrisch-impfung
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB)	89600 A	89600 B	-
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (DTaP-IPV-Hib)	89500 A	89500 B	-
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DTaP)	89300 A	89300 B	-
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap)	89303	-	89303 R
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap) (berufliche bzw. Reiseindikation für Pertussis-Impfung nach § 11 Absatz 3)	89303 Y	-	-
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV)	89400	-	-
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV) Auffrischimpfung Erwachsene	-	-	89400 E
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV) Auffrischimpfung Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	-	-	89400 K

### Übersicht der Abrechnungsziffern:

→ [www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen](http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen) (Mitglieder-Login notwendig)

Wir halten Sie up to date.  
**Ihre KVB**



Weitere Infos rund um Verordnungen:

→ [www.kvb.de/mitglieder/verordnungen](http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen)



KVB Servicecenter

**Kurze Frage – direkte Antwort**

**089 / 570 93-400 10**

Mo–Do 7:30–17:30 Uhr und Fr 7:30–16:00 Uhr

KVB Beratungszentrum

**Terminwunsch für ausführliche Beratung**

→ [www.kvb.de/mitglieder/beratung](http://www.kvb.de/mitglieder/beratung)

Mo–Do 8:00–16:00 Uhr und Fr 8:00–13:00 Uhr