4. November 2026

Verordnung Aktuell

Impfung gegen Dengue



In der Schutzimpfungs-Richtlinie[1] (SI-RL) ist entsprechend dem Epidemiologischen Bulletin Nummer 48 vom 30. November 2023 die Impfung gegen Dengue mit dem Impfstoff Qdenga® bei **beruflicher Indikation** und als **berufliche Reiseimpfung** geregelt.

Der Bezug des Impfstoffs erfolgt per **eRezept** auf den Namen Ihrer Patientin bzw. Ihres Patienten.

- Der tetravalente attenuierte Dengue-Lebendimpfstoff Qdenga® ist ab dem Alter von 4 Jahren in Deutschland zugelassen.
- Die Grundimmunisierung besteht aus zwei Impfstoffdosen, die im Abstand von 3 Monaten s. c. verabreicht werden.

Berufliche Indikation

Personen, die anamnetisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben und außerhalb von Endemiegebieten gezielte Tätigkeiten mit Dengue-Viren ausüben (z. B. in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien), dürfen gemäß SI-RL gegen Dengue geimpft werden.

- Die Grundimmunisierung wird mit 2 Impfstoffdosen des tetravalenten attenuierten Lebendimpfstoffs Qdenga (Mindestabstand 3 Monate zwischen den Impfstoffdosen) durchgeführt.
- Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage über die Notwendigkeit bzw. den Zeitpunkt einer Auffrischimpfung getroffen werden.
- Für Personen, die in der Vergangenheit keine Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben („Dengue-Naive“), spricht die STIKO aufgrund der gegenwärtig limitierten Datenlage derzeit keine allgemeine Impfempfehlung aus.

[1] Schutzimpfungs-Richtlinie: www.g-ba.de/richtlinien/60/

Reiseindikation

Personen ab 4 Jahre, die anamnetisch eine labordiagnostisch gesicherte **Dengue-Virus-Infektion** durchgemacht haben und in ein **Dengue-Endemiegebiet** reisen sowie dort einem **erhöhten Expositionsrisiko** ausgesetzt sind (z. B. längerer Aufenthalt, aktuelles Ausbruchsgeschehen), dürfen gemäß SI-RL gegen Dengue geimpft werden.

- Bei Impfung aufgrund von Auslandsaufenthalten besteht ein Leistungsanspruch nur im Rahmen des § 11 Absatz 3 SI-RL.
- Die Grundimmunisierung wird mit 2 Impfstoffdosen des tetravalenten attenuierten Lebendimpfstoffs Qdenga (Mindestabstand 3 Monate zwischen den Impfstoffdosen) durchgeführt.
- Die vollständige Impfserie (2 Impfstoffdosen) sollte vor Abreise in ein Dengue-Endemiegebiet abgeschlossen sein.
- Zu Dengue-Endemiegebieten siehe auch Empfehlungen der STIKO zu Reiseimpfungen (Ländertabelle)[2].
- Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage über die Notwendigkeit bzw. den Zeitpunkt einer Auffrischimpfung getroffen werden.
- Für Personen, die in der Vergangenheit keine Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben („Dengue-Naive“), spricht die STIKO aufgrund der gegenwärtig limitierten Datenlage derzeit keine allgemeine Impfempfehlung aus.

Wir halten Sie up to date.
Ihre KVB

Weitere Infos rund um Verordnungen:
→ **www.kvb.de/mitglieder/verordnungen**

KVB Servicecenter
Kurze Frage – direkte Antwort
089 / 570 93-400 10
Mo–Do 7:30–17:30 Uhr und Fr 7:30–16:00 Uhr

KVB Beratungscenter
Terminwunsch für ausführliche Beratung
→ **www.kvb.de/mitglieder/beratung**
Mo–Do 8:00–16:00 Uhr und Fr: 8:00–13:00 Uhr

[2] www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/R/Reiseassoziierte-Infektionskrankheiten/reiseassoziiert-node.html