



Verordnung Aktuell Arzneimittel

Stand: 23. Januar 2012

Eine Information der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns ■ Verordnungsberatung@kvb.de ■ www.kvb.de/praxis/verordnungen

■ Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie (Si-RL): Impfung gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken

Für die erste Impfung gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken soll zunächst die getrennte Gabe der kombinierten Masern-Mumps-Röteln-Impfung einerseits und einer Varizellen-Impfung andererseits bevorzugt werden. Die zweite Impfung kann dann mit einem so genannten MMRV-Kombinationsimpfstoff erfolgen. Grund für die Änderung waren Ergebnisse einer Metaanalyse von Daten aus klinischen Studien mit Priorix-Tetra®. Die Metaanalyse weist darauf hin, dass Fieberkrämpfe im Zeitraum von 5 bis 12 Tagen nach der ersten Dosis Priorix-Tetra® häufiger auftreten als nach gleichzeitiger, aber getrennter Gabe von MMR- und V-Impfstoffen (an unterschiedlichen Impforten).

Die Änderungen treten rückwirkend zum 24. November 2011 in Kraft. Hier der entsprechende Auszug der Anlage 1 der Si-RL zur schnellen Übersicht:

Impfung gegen	Indikation	Hinweise zu den Schutzimpfungen	Anmerkungen
Masern	Immunisierung beginnend mit der ersten Impfdosis im Alter zwischen dem 11. bis 14. Lebensmonat und Abschluss mit der 2. Impfdosis vor Ende des 2. Lebensjahres vorzugsweise mit einem MMR bzw. MMRV-Kombinationsimpfstoff.		Bei der ersten Impfung gegen Masern, Mumps, Röteln und Varizellen sollte –bis zum Vorliegen weiterer Daten – die getrennte Gabe der MMR-Impfung einerseits und der Varizellen-Impfung andererseits bevorzugt werden. Die zweite Impfung gegen MMRV kann dann bevorzugt mit einem MMRV-Kombinationsimpfstoff erfolgen. (Epidemiologisches Bulletin Nr. 38 vom 26.09.2011, S. 352)“.
Mumps			
Röteln			
Varizellen			

Hilfe bekommen Sie auch am **Service-Telefon Verordnung** unter **0 89 / 57 09 34 00 – 30**.