



Verordnung Aktuell Arzneimittel

Stand: 29. April 2013

Eine Information der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns ▪ Verordnungsberatung@kvb.de ▪ www.kvb.de/praxis/verordnungen

■ Nutzenbewertung nach § 35a SGB V: Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses im 1. Quartal 2013

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Nutzenbewertung zusammengestellt. Ausführliche Informationen zu den einzelnen G-BA-Beschlüssen finden Sie jeweils in einem separaten *Verordnung Aktuell* unter [www.kvb.de/ Praxis/ Verordnungen/ Frühe Nutzenbewertung](http://www.kvb.de/Praxis/Verordnungen/Fruehe_Nutzenbewertung).

Weitere Hilfe bekommen Sie – **als Mitglied der KVB** - am Service-Telefon Verordnung unter **0 89 / 57 09 34 00 – 30**.

Wirkstoff / Fertigarzneimittel	Vergleichstherapie	Bewertung
Aclidiniumbromid / Eklira Genuair [®] , Bretaris Genuair [®]	Patienten ab Therapiestufe II: langwirksame Beta-2-Sympathomimetika (Formoterol, Salmeterol) und/oder langwirksame Anticholinergika (Tiotropiumbromid).	Kein Zusatznutzen
	Patienten ab Therapiestufe* III/IV mit mehr als zwei Exazerbationen: langwirksame Beta-2-Sympathomimetika (Formoterol, Salmeterol) und/oder langwirksame Anticholinergika (Tiotropiumbromid) und zusätzlich inhalative Corticosteroide.	Kein Zusatznutzen

* Das Stufenschema der Nationalen Versorgungsleitlinie COPD, Version 1.9, Januar 2012 ist bei beiden Patientengruppen zu berücksichtigen.

Wirkstoff / Fertigarzneimittel	Vergleichstherapie	Bewertung
Axitinib/ Inlyta®	nach einer Vortherapie mit Sunitinib: Everolimus	Kein Zusatznutzen
	nach einer Vortherapie mit Zytokin: Sorafenib.	Zusatznutzen gering
Ivacaftor/ Kalydeco®	Ivacaftor ist ein Wirkstoff zur Behandlung eines seltenen Leidens („Orphan Drug“)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kinder (6 bis 11 Jahre): Zusatznutzen gering (aufgrund eines fehlenden Nachweises zu pulmonalen Exazerbationen). ■ Jugendliche (ab 12 Jahre) und Erwachsene: Zusatznutzen beträchtlich
Linagliptin/ Trajenta® Erneute Nutzenbewertung nach Vorlage eines neuen Dossiers.	Monotherapie: Sulfonylharnstoff (Glibenclamid, Glimepirid)	Kein Zusatznutzen
	Zweifachkombinationstherapie Linagliptin + Metformin: Sulfonylharnstoff (Glibenclamid, Glimepirid) + Metformin	Kein Zusatznutzen
Perampanel/ Fycompa®	Für die Zusatztherapie fokaler Anfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Epilepsiepatienten ab 12 Jahren: Lamotrigin als Zusatztherapie	Kein Zusatznutzen
	In den Fällen, in denen Lamotrigin als Monotherapie angewandt wird: Topiramamat als Zusatztherapie	Kein Zusatznutzen
Ruxolitinib/ Jakavi®	Ruxolitinib ist ein Wirkstoff zur Behandlung eines seltenen Leidens („Orphan Drug“)	Zusatznutzen gering