



Verordnung Aktuell Arzneimittel

Stand: 11. Dezember 2013

Eine Information der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns ▪ Verordnungsberatung@kvb.de ▪ www.kvb.de/praxis/verordnungen

■ Nutzenbewertung nach § 35a SGB V: Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses im 3. Quartal 2013

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Nutzenbewertung zusammengestellt. Ausführliche Informationen zu den einzelnen G-BA-Beschlüssen finden Sie jeweils in einem separaten *Verordnung Aktuell* unter www.kvb.de > Praxis > Verordnungen > Frühe Nutzenbewertung.

Der G-BA geht vermehrt dazu über neben dem Ausmaß auch die Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens zu qualifizieren.

Zusatznutzen	
Wahrscheinlichkeit	Ausmaß
■ Beleg	■ erhebliches
■ Hinweis	■ beträchtliches
■ Anhaltspunkt	■ geringes
	■ kein Beleg
	■ geringeres

Wie die einzelnen Begriffe definiert wurden, lesen Sie unter www.kvb.de > Praxis > Verordnungen > Frühe Nutzenbewertung.

Weitere Hilfe bekommen Sie – **als Mitglied der KVB** - am Service-Telefon Verordnung unter **0 89 / 57 09 34 00 – 30**.

Wirkstoff / Fertigarzneimittel	Vergleichstherapie	Bewertung
Abirateronacetat / Zytiga® - neues Anwendungsgebiet	Abwartendes Vorgehen unter Beibehaltung der bestehenden konventionellen Androgendeprivation oder gegebenenfalls die kombinierte, maximale Androgenblockade mit einem nichtsteroidalen Antiandrogen (Flutamid, Bicalutamid).	Hinweis für einen beträchtlichen Zusatznutzen.
Aflibercept / Zaltrap® - neues Anwendungsgebiet	Kombinations-Chemotherapie aus 5-Fluorouracil, Folinsäure und Irinotecan	Hinweis für einen geringen Zusatznutzen.
Apixaban / Eliquis® - neues Anwendungsgebiet	Vitamin-K-Antagonisten	Hinweis für einen geringen Zusatznutzen.
Fidaxomicin / Difficlr®	Patienten mit milden behandlungspflichtigen Krankheitsverläufen von Clostridium-difficile-assoziierten Diarrhöen: Metronidazol	Kein Zusatznutzen
	Patienten mit schweren und/ oder rekurrenten Krankheitsverläufen von Clostridium-difficile-assoziierten Diarrhöen: Vancomycin	beträchtlicher Zusatznutzen
Ingenolmebutat / Picato®	Diclofenac-Hyaluronsäure Gel (3 %) oder 5-Fluorouracil (5-FU) in der topischen Anwendung oder (chirurgische) Kryotherapie bei der Behandlung von Einzelläsionen	kein Zusatznutzen

Wirkstoff / Fertigarzneimittel	Vergleichstherapie	Bewertung
Lixisenatid / Lyxumia®	Kombinationstherapie mit Metformin, wenn Metformin den Blutzucker zusammen mit einer Diät und Bewegung nicht ausreichend senkt: Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) + Metformin	kein Zusatznutzen
	Zweifach-Kombination mit einem oralen Antidiabetikum (außer Metformin), wenn dieses zusammen mit einer Diät und Bewegung den Blutzucker nicht ausreichend senkt: Metformin + Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) Hinweis: Wenn Metformin gemäß Fachinformation nicht geeignet ist, ist Humaninsulin als Therapieoption einzusetzen.	kein Zusatznutzen
	Dreifach-Kombination mit oralen Antidiabetika, wenn diese zusammen mit einer Diät und Bewegung den Blutzucker nicht ausreichend senken: Metformin + Humaninsulin Hinweis: Ggf. Therapie nur mit Humaninsulin, wenn Metformin nicht ausreichend wirksam ist.	kein Zusatznutzen
	Kombination mit einem Basalinsulin mit oder ohne Metformin, wenn Basalinsulin (mit oder ohne Metformin) zusammen mit einer Diät und Bewegung den Blutzucker nicht ausreichend senkt: Metformin + Humaninsulin Hinweis: Ggf. Therapie nur mit Humaninsulin, wenn Metformin gemäß Fachinformation unverträglich oder nicht ausreichend wirksam ist.	kein Zusatznutzen
Vandetanib / Caprelsa®	Best-Supportive-Care*	Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen

* Als Best-Supportive-Care wird die Therapie verstanden, die eine bestmögliche, patientenindividuell optimierte, unterstützende Behandlung zur Linderung von Symptomen und Verbesserung der Lebensqualität gewährleistet.